Elaborado por: Mónica Álvarez	*Revisado por: Mónica Álvarez*	*Aprobado por: Mónica Álvarez*
Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos regulatorios

PICLORAM 240 SL-DVA

Registro Nacional ICA No. 1642
Titular del Registro: DVA DE COLOMBIA LTDA.

GENERALIDADES

Tipo de Producto: Herbicida Agrícola
Formulación: Concentrado Soluble -SL
Ingrediente Activo: Picloram
Concentración: 240 g/L
Categoría Toxicológica: III – Ligeramente Peligroso
Cultivo: Potreros
Presentación Disponible: 1 L, 20 L

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

PICLORAM 240 SL–DVA es un herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, que inhibe rápidamente su crecimiento. El efecto de control en las malezas se observa 1 a 3 semanas después de la aplicación, dependiendo de su estado de crecimiento y susceptibilidad. Las malezas no presentarán síntomas iniciales de fitotoxicidad, pero su actividad y competencia con el cultivo es nula. El control es más efectivo en malezas en crecimiento activo, especialmente en sus primeros estados de desarrollo. Evite que la deriva de la aplicación llegue a cultivos de hoja ancha.

COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:

Picloram.....240 g/L
4-amino-3, 5,6,-trichloropyridine-2-carboxylic acid

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1L

RECOMENDACIONES DE USO

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

Cultivo	Blanco Biológico	Dosis	P.C.	P.R.
Potreros	Bledo (*Amaranthus dubius*), Dormidera (*Mimosa púdica*), Lengua de vaca (*Rumex conglomeratus*), Mortiño (*Clidemia rubra*)	1.0 L/ha	15 días	0 horas

P.C: Periodo de Carencia: Intervalo de tiempo entre la última aplicación y la cosecha.
P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado. En caso de ser necesario el ingreso antes del tiempo determinado como periodo de reentrada, se debe usar pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado y para las labores que impliquen contacto de las manos con el área tratada, se debe usar guantes.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una (1) sola aplicación por ciclo de cultivo, sobre malezas en activo crecimiento, especialmente en sus primeros estados de desarrollo.

Rotar las aplicaciones con herbicidas de diferente mecanismo de acción o grupo químico, dentro de un programa de manejo integrado de malezas.

No aplique el producto ni vacíe ni limpie el equipo cerca de plantas o cultivos útiles (especialmente de hoja ancha) o en sitios hacia donde sus raíces puedan extenderse o de donde el producto pueda ser arrastrado hasta sus raíces. No aplicar si la velocidad del viento es de 10 o más Km por hora, para evitar el arrastre de la deriva. Deje franjas o zonas de seguridad evitando que la deriva del producto llegue a dañar cultivos vecinos o lotes donde se vayan a sembrar cultivos susceptibles al herbicida. En lotes seguidos de Arroz en diferentes estados de desarrollo, se debe evitar que la deriva del producto llegue a los lotes en floración ya que el daño puede ser severo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Llene el tanque de mezcla hasta ¼ de su capacidad con agua, agite y agregue la dosis del producto. Complete el volumen final con agua y adicione el surfactante de último cuando el tanque está casi lleno; continúe agitando. Use de 200-400 litros de agua por hectárea en aplicación terrestre. LIMPIEZA DEL EQUIPO: Limpie exhaustivamente el equipo después de aplicar el producto hasta asegurarse de que no queden residuos, ya que se puede ocasionar daño a cultivos susceptibles que se fumiguen posteriormente: algodón, maíz, soya, maní, ajonjolí, arroz en primordio floral o en floración. Limpie el equipo (tanque, mangueras, aguilones y boquillas) enjuagándolo primero con agua limpia y luego con una solución al 5 por 1.000 de blanqueador clorinado (5 centímetros cúbicos de blanqueador por litro de agua). Se pueden usar blanqueadores como: CLOROX. HIPOCLOR, DECOL, etc. (Hipoclorito de sodio al 5%). Repita ambos enjuagues y realice un enjuague final con agua limpia.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Las mezclas con insecticidas organofosforados pueden producir daño al cultivo. Con variedades nuevas haga pruebas a pequeña escala antes de usar el producto. Realice pruebas previas de compatibilidad en caso de duda.

No es fitotóxico si se siguen las dosis y recomendaciones indicadas. En caso de duda, haga una aspersión en una pequeña área de cultivo.

Manejo de malezas resistentes: Aplique el producto una sola vez por ciclo de cultivo y rote las aplicaciones con otros productos de diferente modo de acción o grupo químico, dentro de un programa de manejo integrado (evitar que las malezas semillen, cultivar mecánicamente, etc.). El uso repetido de herbicidas de un mismo grupo químico origina biotipos de malezas resistentes a dichos herbicidas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

Formulado por:
DVA (SHANGHAI) CHEMICALS Co. Ltd.
Room A2, Huamin Empire Plaza
No. 726 Yan'an Rd (w) 200050, Shanghai, China.

YONGNONG BIOSCIENCES Co. Ltd.
No. 3, Weiqi Rd (East) Hangzhou Gulf Fine Chemical Zone, Shangyu, Zhejiang, China.
Tel: 86-531-88875222

Importado y Distribuido por:
DVA DE COLOMBIA LTDA.
Km. 1.5 Vía Chía – Cajicá
Centro Empresarial Oxus Oficina 509
PBX: 7427042
Chía (Cundinamarca) - Colombia